


Crecimiento y producción/comportamiento de razas de ganado vacuno F1 adaptado al tropico x Angus en áreas de pastoreo áridas



**J.W. Holloway, B.G. Warrington,
D.W. Forrest, and R.D. Randel**



- **Evaluar la producción en áreas de pastoreo áridas**



- **Comparar a condiciones húmedas (Chase et al., 1999, JAS 78:1111)**



Métodos

- 1. 489 récords de predestete de becerros nacidos a vacas Angus en '92, '93, '94 y '95**
- 2. Hembras Angus sincronizadas AI a toros Brahman, Senepol y Tuli para parir de febrero - abril**
- 3. Destetados en octubre con ajustes de peso por la edad de la vaca, edad y sexo**




- 4. 468 récords de parir para hembras F1 a través de 3 grupos apareados con toros Hereford**
- 5. Ninguna hembra descartada**
- 6. Area de pastoreo mixta;**
 - 15-20 heno/unidad por animal**
 - 571 mm lluvia/año (alcance 427 de 633 mm)**




7. Becerros de ganado F1acuartelados OK, alimentados en regaderas de TX




Peso al Nacer, kg de Becerros F1 x Angus




Porcentaje de Becerros Nacidos Vivos y Vigorosos




Porciento Nacido Muerto




Sobrevivencia de Becerro




ADG Predeste, kg/d



Peso al Destete (kg)



Puntaje de Condición al Destete y Constitución para el Sur de Texas



Producción de primeras becerras F1 apareadas con toros Hereford





Tuli x



Senepol x




Brahman x




Senepol x


Peso al nacer de becerros de cruces Hereford de hembras primerizas, kg



Porcentaje de hembras con dificultad al parir su primer becerro




Porcentaje de hembras primerizas que sostienen la producción




Tres Hereford X grupos de ganado




Peso de Hembra, kg/d




Porciento Preñadas




Porciento de hembras destetando becerros




Peso al destete de cruces Hereford, kg



Peso al destete----- Weight Weaned/Cow Exposed



Eficacia, kg/100 kg ----- Cow Exposed



Resumen:

Cuadro Balanceado

Senepol x Angus en el Sur de Texas:

1. Fácil mantenimiento:

- Mod. Tamaño-mod. nutr. demanda**





2. Maduración temprana

3. Buena disposición

4. Sin problemas de ubre




A black cow is standing in a field with trees in the background. The cow is facing right and is the central focus of the image. The background shows a line of trees and a clear sky.

5. Tolerante al calor

6. Longevidad

7. Carne tierna



A brown cow is standing in a field with trees in the background. The cow is facing right and is partially obscured by the text overlay. The background shows a line of trees and a clear sky.

**8. Si se maneja la
dificultad al parir y la
sobrevivencia de
becerros:**

– Alta eficacia

Posibilidades de Reproducción-

- 1. Selección por facilidad al parir y sobrevivencia de becerros**
- 2. Determinar la heterosis entre el Senepol y otras razas en cuanto a dificultad al parir y sobrevivencia de becerros**





El fin

